

10 passos para o controle eficiente do carrapato dos bovinos

1 Use a arma adequada.

Cada propriedade deve ter seu teste de sensibilidade dos carrapatos aos carrapaticidas, que é feito gratuitamente pela Embrapa Gado de Leite.




2 Combata o inimigo quando ele estiver em menor número.

Nos meses de menores infestações, mais quentes ou mais secos, faça cinco ou seis banhos estratégicos nos animais, um a cada 21 dias ou quatro a cinco tratamentos pour on a cada 30 dias.



3 Siga as orientações.

A bula do produto deve ser lida para seguir todas as recomendações do fabricante, principalmente quanto à homogeneização, dosagem, período de descarte do leite e permissão para uso em vacas em lactação.





4 Proteja-se.

No preparo e aplicação do produto, utilize máscaras, luvas e vestuário adequados e banhe os animais a favor do vento, para evitar danos à sua saúde.



5 Dê o tiro certo.

O banho deve ser dado com o animal contido, no sentido contrário ao dos pelos, com pressão adequada e em toda a superfície do corpo. Evite dias de chuva e horários de sol forte. Em caso de tratamento pour on (na linha do dorso), avalie o peso de cada animal para aplicação da quantidade correta do produto, de acordo com as recomendações da bula.



6 Use a tática dos "animais aspiradores".



Os animais recém-tratados devem retornar às pastagens infestadas para que funcionem como "aspiradores" dos carrapatos que lá estão à espera do hospedeiro. Os carrapatos que subirem nos animais serão mortos quando entrarem em contato com o produto. Os que conseguirem sobreviver serão combatidos no próximo banho.

7 Cuide melhor dos animais de "sangue doce".

Os bovinos mais infestados, conhecidos como animais de "sangue doce", são as fábricas de carrapatos do rebanho. Devem ser identificados, tratados com maior frequência e avaliados para possível descarte.

Avalie o desempenho de sua arma.

O teste de sensibilidade dos carrapatos aos carrapaticidas deve ser repetido anualmente. Troque o carrapaticida por outro de mecanismo de ação diferente, anualmente, de acordo com os resultados do novo teste.

Trate os animais que vêm de fora.

Os animais recém-adquiridos devem ser tratados de preferência no local de origem e mantidos isolados por 30 dias antes de sua incorporação ao rebanho.

Evite infestações mistas.

Equinos e bovinos devem ser mantidos em pastos separados, pois os bovinos também podem ser



infestados pelos carrapatos dos equinos ("carrapato-estrela"), cujo controle é diferente.

Siga o passo a passo e livre seu rebanho da infestação.